

Pinkbauch Stachelleguan

Sceloporus variabilis (oloporus)

Schutzstatus

nicht geschützt

Verbreitung

Mittelamerika

Lebensraum

trockene Gebiete (Strand, Trockenwald), steinig aber auch Feucht- und Nebelwälder, tagaktiv

Größe

bis 14 cm

Lebenserwartung

über 10 Jahre

Fortpflanzung

bis zu 5 Eier. Zeitigungsdauer bei 28°C etwa 50-60 Tage.

Temperatur

trockene Gebiete (Strand, Trockenwald), steinig aber auch Feucht- und Nebelwälder, tagaktiv

Luftfeuchtigkeit

50-60%

Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren, gegebenenfalls UV Röhren (siehe Leuchtstoffröhren). Für ausreichende UV Strahlung empfehlen sich UV Strahler oder die Arcadia D3 Compact. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte. Art benötigt eine hohe Lichtintensität. Gegebenenfalls empfiehlt sich auch der Einsatz von HQI Strahlern oder T5 Leuchtstoffröhren.

Bodengrund

Lehmhaltige Erde mit Felsaufbau oder Wüstensand bzw. feiner Kies. Reptile Cannabis Bedding

Einrichtung

Unterschlupfmöglichkeiten, Steine, Wurzeln u. a. Klettermöglichkeiten, flache Wasserschale. Bodengrund sollte an einer Stelle immer leicht feucht sein.

Futter

Insekten (z. B. Grillen, Heimchen, kleinere Heuschrecken, Schaben, Zophobas, Wachsmotten, etc.) auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich.

Bemerkung

Können gut in kleineren Gruppen gepflegt werden (z. B. 1 Männchen mit 2-4 Weibchen). Kulturfolger!

Literatur

BOSCH, H. & H. WERNING (1991): Leguane. - Terrarien Bibliothek, 120 S.

KÖHLER, G. & P. HEIMES (2002): Stachelleguane - Lebensweise, Pflege, Zucht. - Herpeton Verlag, Offenbach, 174 S.

WERNING, H. (2002): Stachelleguane. - NTV, Münster, 143 S.

