

## Afrikanische Eierschlange

*Dasypeltis scabra*

### Schutzstatus

Nicht geschützt

### Verbreitung

Teile Afrikas (u. a. S-Marokko, Ägypten, Sudan, Somalia, bis nach W-, O-, Z- und S-Afrika)

### Lebensraum

trockene Busch- und Waldgebiete

### Größe

50-70 cm, max. 120 cm

### Fortpflanzung

legt bis zu 18 Eier. Zeitigungsdauer bei 30 °C etwa 60-70 Tage

### Temperatur

trockene Busch- und Waldgebiete

### Luftfeuchtigkeit

40-50%

### Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0

### Bodengrund

Lehmhaltige Erde mit Felsaufbau, Wüstensand

### Einrichtung

Unterschlupfmöglichkeiten, Steine, Wurzeln u. a. Klettermöglichkeiten, flache kleine Wasserschale. Bepflanzung möglich (Ficus benjamina, F. pumila, Scindapsus ect.)

### Futter

je nach Größe: Eier von Kanarienvögeln, Wellensittichen oder Europäischen Wachteln

### Bemerkung

Wenn das Problem der Futtermittellieferung gelöst wurde, ist *Dasypeltis scabra* i.d.R. ein einfach zu haltender Pflegling

### Literatur

TRUTNAU, L. (2002): Ungiftige Schlangen, Schlangen im Terrarium, Band 1. - Ulmer Verlag, 628 S.



ein Service von **Lucky Reptile**